

**(၃) ဖျူစေရီယံနံ့ခြောက်ရောဂါ (Fusarium head blight)**

**ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Gibberella zae* (Schwein.) Petch (*Fusarium graminearum* Schwabe)**

**ရောဂါလက္ခဏာ**

ရောဂါကျရောက်ပါက အနံ့သည်ခြောက်လာသည်။ တစ်ချို့အနံ့များ၏ အရင်းပိုင်းသည် အညိုရင့်ရောင် ဖြစ်နေပြီး လိမ္မော်ရောင်မှိုအစုအဝေးကို အနံ့စေ့များတွင်တွေ့ရသည်။ ရောဂါကျသောအနံ့မှ ဂျုံစေ့များသည် တွန့်ရှုံ့၍ပုံပျက်နေပြီး ပန်းရောင်အစွန်းအထင်းများဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည်။



**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ**

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုသုံးပါ။
- ရောဂါရအခင်းမှမျိုးစေ့ကိုမစိုက်ပျိုးသင့်ပါ။
- မျိုးစေ့အားမျိုးစေ့လူးနယ်မှုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါက Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုး)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး) စသောမှုသတ်ဆေး များဖြင့် အသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။