


(၂) ဖိုက်သော်သရာပင်နာကျရောဂါ (Phytophthora blight)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Phytophthora parasitica* var. *sesami*

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်နှင့် ပင်စည်ပေါ်တွင် ရေစိုနာ၊ အညိုရောင်ကွက်ပြောက်ကလေးများ စတင်ဖြစ်ပေါ် ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အရွယ် အစားကြီးမားလာကာ အညိုရင့်ရောင်၊ အနက် ရောင်အကွက်များဖြစ်လာပြီးသည်။ အပင်များဝါခြင်း၊ အပင်ခြောက်ပြီး သေခြင်းများ တွေ့ရသည်။ အသီးများတွင်လည်းရောဂါကျရောက်မှုရှိသည်။ စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင် ရောဂါကျနေသောအသီးပေါ်တွင် အဖြူရောင်မှိုမျှင်စုကိုတွေ့ရသည်။ ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခံ ရပါက အစေ့များသည် တွန့်ရှုံ့နေသည်။ ပင်စည်ပေါ်တွင်ရောဂါကျရောက်ပါက အရွက် များညှိုးနေပြီး၊ ပင်စည်လည်းမည်း၍ခြောက် နေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- စိုက်ခင်းသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ပါ။
- နှမ်းသီးနှံကို နှစ်စဉ်ဆက်တိုက်စိုက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
- ရောဂါကျအခင်းမှ မျိုးစေ့ကို ပြန်မစိုက်ပါနှင့်။ ရောဂါကွက်စတင်တွေ့ရှိပါက Azoxystrobin (အဇိုဆိုစထရိုဘင်)၊ Cymoxanil (ဆိုင်မောက်စနေးလ်)၊ Dimethomorph (ဒိုင်မီသိုမော့ပ်)၊ Metalaxyl (မီတယ်လဆို)၊ Fosetyl-AL

(ဖေ့စတိုင်အေအယ်လ်) စသောမို့သတ်ဆေးများကို အရွက်ပေါ်နှင့်  
ပင်ခြေမြေကြီးထဲသို့ခွဲဖျန်းပေးပါ။