



(၃) ဖါးဥမို့ရောဂါ (Powdery mildew)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Oidium heveae* Steinm

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်ပေါ်တွင် အဖြူရောင် ဝါဂွမ်းစုသဏ္ဍန် (သို့မဟုတ်) ပေါင်ဒါမှုန့်များ ဖြူးထားသကဲ့သို့ ရောဂါကွက်များကို မြင်တွေ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရောဂါကွက် များမှာ တစ်ရှူးသေကွက်များ ဖြစ်သွားသည်။ အပွင့်နှင့်အသီးများတွင် ရောဂါကျပါက ကြွေကျသည်။ ရော်ဘာပင် များသည် ဆောင်းရာသီ (သို့မဟုတ်) ရွက်နုထွက်သော ရာသီတို့တွင် ဖါးဥမို့ရောဂါ ပိုမိုပြင်းထန်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါက Sulfur ပါဝင်သောဆေး၊ Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုင်း)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုထာလိုနေးလ်)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုင်း)။

Kresoxim Methyl (ကရီဆိုဇင်မ်မီသိုင်း) စသော မှိုသတ်ဆေးများဖြင့် ထိရောက်စွာ
ကာကွယ်နှိမ်နင်း နိုင်ပါသည်။