

(၄) ပန်းရောင်မိုရောဂါ (Pink disease)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Erythricium salmonicolor* (Berk. & Broome) Burds.

(*Corticium salmonicolor* Berk. & Broome)

ရောဂါလက္ခဏာများ

ရောဂါလက္ခဏာမှာ အစိုဓာတ်အမြဲရှိနေလေ့ရှိသော အပင် (သို့မဟုတ်) အကိုင်း၏ သစ်ခေါက်ပေါ်တွင် ပန်းရောင်မိုအစုအဝေးအကွက်များနှင့် ၎င်းဒါဏ်ရာနေရာမှ အစေးများ စီးကျသောအစင်းကြောင်းများကိုတွေ့ရသည်။ သစ်ခေါက်သည် ပုပ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း နှင့် ကွဲအက်ခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။ အပင်သက်တမ်း (၂-၁၂) နှစ် အရွယ်တွင် ထိုရောဂါအဖြစ် များသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ပင်စည်နှင့်အကိုင်းများအား ဘော်ဒိုဆေးရည်ပျစ် (သို့) ကော့ပါးပါဝင်သော မှိုသတ်ဆေးကို ပျစ်ပျစ်ဖျော်၍သုတ်လိမ်းပါ။
- ကိုင်းခြောက်များအား ခုတ်ယူပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။

- ရောဂါကွက်များအား Copper Oxychloride (ကော့ပါးအောက်ဆီကလိုရိုဒ်) ၊ Validamycin (ဗယ်လီဒါမိုင်စင်)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး လ်) မှီသတ်ဆေးများ ဖြင့် သုတ်လိမ်းပါ။