

## ၂) ကြိမ့်နှံ့ရောဂါ (Whip Smut)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll  
& Oberw. (*Ustilago scitaminea* Syd.)

### ရောဂါလက္ခဏာ

ရောဂါကျရောက်ပါက ကြိပင်ထိပ်ဖျားပိုင်းအဖူးနေရာမှ အမဲရောင်မှိုမျှင်များ ဖုံးလွှမ်းနေသော နှင်တံ(ကြာပွတ်) သဏ္ဍာန် ကြိမ့်နှံ့ထွက်နေသည် ကိုတွေ့ ရသည်။ ကြိပင်၏ဘေးတဖက်တချက်မှလည်း ကြိမ့်နှံ့ ဖောက်ထွက်တတ်သည်။



### ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးကိုစိုက်ပါ။
- ရောဂါကင်းသော ကြိမျိုးပိုင်းကို သုံးစွဲပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- ရောဂါကျကြိခင်းအားလမိုင်းမထားပါနှင့်။
- မျိုးဆစ်ပိုင်းများအား Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုင်း)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုင်း) ဆေးဖျော် ရည်တွင်စိမ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးပါ။

- ရောဂါကျရောက်ပါက Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုင်း)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုင်း)၊ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်ဇ်) စသော မှိုသတ်ဆေးများ အသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။