

(၃) ကြက်သွန်ထိပ်ပုပ်ရောဂါ (Neck rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ- *Ciborinia allii* (Sawada) L.M. Kohn 1979,
(*Botryotinia allii* (Sawada) W. Yamam 1956)

ရောဂါလက္ခဏာ

ကြက်သွန်ဥ ဂုတ်ပတ်လည်တွင် တစ်သျှူးသားများပျော့၍ အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး မှိုအညိုရောင်/ အနက်ရောင်အစုများတွေ့ရသည်။ ၎င်းဒဏ်ရာမှ ဘက်တီးရီးယား ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် အပျော့ပုပ်ရောဂါထပ်ဆင့်ဖြစ်စေသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကင်း၍ ကောင်းမွန်စွာခြောက်သွေ့ပြီးသော ကြက်သွန်မျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- မြေဆောင်မှုရောဂါအတွက် မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ် စိုက်ပျိုးပါ။
- စိုက်ချိန်နောက်ပိုင်းတွင် နိုက်ထရိုဂျင် (ပုလဲ) မြေဩဇာ လွန်ကဲစွာ ကျွေးခြင်း မပြုရ။ ကြက်သွန်မတူးဖော်မီ (၁၀)ရက်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း ရေသွင်း ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတု ကြက်သွန်တူးဖော်ပါ။

- အမြိတ်မဖြတ်မီ တစ်ပတ်အလိုတွင် စိုက်ခင်းကို အခြောက်ထားပါ။
- သိုလှောင်ခြင်းမပြုမီ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် ပြုလုပ်ပေးပါ။
- သိုလှောင်ရာတွင် အပူချိန် (၃၄-၃၆) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် စိုထိုင်းဆ (၇၀%) ထက် လျော့နည်းမှသာလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
- ရောဂါလက္ခဏာ စတွေ့သည်နှင့် အောက်ပါမှိုသတ်ဆေးများ အသုံးပြုပါ။
- Azoxystrobin (အဇီဆီစထရိုဘင်)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)
Iprodione (အိုင်ပရိုဒီအိုနီး)၊ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)