

(၃) ခါးရီရောဂါ (Damping off)

ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ- *Rhizoctonia solani* J.G. Kühn, 1858)

ရောဂါလက္ခဏာ

မြေပြင်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် ပင်စည်ပိုင်းသည် ရေစိုနာ ဖြစ်လာပြီး ပျော့လာကာ အပင်ယိုင်လဲ သေဆုံးသည်။ မျိုးစေ့ အပင်မပေါက်မီနှင့် အပင်ပေါက်ပြီး ပျိုးပင်ပေါက် ဘဝတွင် သေဆုံး ကြသည်။ အမြစ်များလည်း ရောဂါဖြစ်ပြီး အပင် သေသွားသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးကို သုံးပါ။
- ရောဂါ ကင်းသော ပျိုးပင်ကို သုံးပါ။
- မျိုးစေ့အား မျိုးစေ့လူးနယ်မှုသတ်ဆေးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ခရမ်းချဉ် ခါးရီရောဂါကို ကာကွယ်ရန် Trichoderma မှုကို မြေခံအဖြစ် အသုံးပြု နိုင်သည်။ စိုက်ပြီး ခါးရီရောဂါ ကျရောက်ပါက ပျိုးပင် သက်တမ်း ၂၀-၃၀ ရက်သားတွင် တစ်ကြိမ် Trichoderma မှုကို ရေဖျော်၍ ဖျန်းပေးရပါမည်။ ရောဂါကျရောက်ပါက အောက်ပါမှုသတ်ဆေးများကိုပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

Thiophanate-methyl(သိုင်အိုဖါနိုတ်မီသိုင်း), Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး),
Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး), Validamycin (ဗယ်လီဒါမိုင်စင်)