

(၂) **ဖားဥမွှိရောဂါ (Powdery mildew)**

**ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ- *Oidium mangiferae* Berthet**

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်ပေါ်တွင်အဖြူ(သို့)မီးခိုးရောင်မှုရှင်ကွက်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ရောဂါပြင်းထန် ပါက အရွက်တစ်ခုလုံးအညိုရောင်ပြောင်းသွားပြီးတွန့်လိမ်၍ ခြောက်သွားသည်။ ပန်းခိုင်ပေါ်တွင် ရောဂါကျ ရောက်ပါက အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်/အဖြူရောင် အမှုန့် များကပ် နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရောဂါပြင်းထန်ပါက အရွက်၊ အညွန့်၊ ပန်းခိုင်များ တွန့်လိမ်ခြောက်သွားပြီး အညွန့်များ မဲခြောက်သွားသည်။



**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ**

- ပန်းခိုင်ထွက်ပြီးချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်တို့တွင်ဆေးဖျန်းပါ။
- Sulfur ပါဝင်သောဆေး၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုထာလိုနေး)၊ Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုး)၊ Kresoxim Methyl (ကရီဆိုဇင်မ် မီသိုင်း)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး) စသောမို့ သတ်ဆေး များဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

- Sulphur ပါသောဆေးသည် ဤရောဂါကိုနှိမ်နင်းနိုင်သော်လည်း အပူချိန်မြင့် သော အချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါက ပန်းခိုင်နှင့်သီးကင်းများကို လောင်စေသဖြင့် သတိထားသုံးစွဲသင့်ပါသည်။