

## (၁) ဖားဥမိုရောဂါ (Powdery Mildew)

### ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ (*Oidium nephelii*)

#### ရောဂါလက္ခဏာများ

မိုမိုများကို အသီးကင်းဝင်စအရွယ်တွင် အသီးပေါ်၌ တွေ့ရသည်။ မိုစပိုးများ သည် လေမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပြီး အရွက်နှင့် ပန်းခိုင်များတွင်လည်း တွေ့မြင် ရပါသည်။ ရောဂါပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ ရောဂါကျသောအပိုင်းများကို အဖြူရောင်မိုမိုများက ဖုံးအုပ်သွားပြီး ရောဂါဖြစ်နေသော အသီးမှာလည်း အက်ကွဲသွားကာ အရွယ်မတိုင်မီကြွေကျသွားပါသည်။



#### ကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကျရောက်သောအသီးနှင့် အကိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှား ပစ်ပါ။
- ရွက်ကြွေများအားစုစည်းပြီး စွန့်ပစ်ပါ။
- ခြံသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပါ။
- အောက်ပါမိုသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  - Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)

- Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)
- Sulfur (ဆာလ်ဖာ)
- Kresoxim - Methyl (ကရီဆိုဇင်မ်-မီသိုင်း)
- Trifloxystrobin (ထရိုင်းဖလောက်ဆီစထရိုဘင်)