

## (၃) ဖားဥမှုှိရောဂါ (Powdery Mildew)

ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - *Oidium nephelii*

ရောဂါလက္ခဏာများ

ပေါင်ဒါမှုှိကဲ့သို့သောအဖြူရောင်မှုှိများကို အရွက်မျက်နှာပြင်နှင့် အသီးများပေါ် တွင် အကွက်လိုက် တွေ့ရသည်။ အပွင့်ပွင့်ချိန်နှင့် အသီးကင်းဝင်ချိန်များတွင် ရောဂါကျ ရောက်ပါက အပွင့် အသီးကင်းများ ကြွေကျနိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကျအပင်အစိတ်အပိုင်းများကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပါ။မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- အောက်ပါမို့သတ်ဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  - o Myclobutanil (မိုက်ကလိုဗျူသာနေး)
  - o Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇီး)
  - o Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇီး)
  - o Sulfur (ဆာလ်ဖာ)
  - o Kresoxim methyl (ကရီဆိုဇင်မ်-မီသိုင်း)
  - o Trifloxystrobin (ထရိုလ်ဖလောက်ဆီစထရိုဘင်)

