

## ၆။စပါးရွက်ခေါက်ပိုး

Rice leaffolder : *Cnaphalocrosis medinalis* (Guenée, 1854)

Lepidoptera: Pyralidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်ငယ်သည်အဖြူဖျော့ရောင်နှင့်အမဲရောင်ဦးခေါင်းရှိသည်။အကောင်ကြီး  
လာသောအခါဦးခေါင်းမှာအညိုဖျော့ရောင်နှင့်.ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်လင်ပြီးအမွှေးအညိုရောင်များ  
နှင့်.ဖုံးထားသည်။ရုပ်ဖုံးမှာအညိုရောင်ရောင်ရှိသည်။အကောင်ကြီးမှာငွေရောင်ရှိပြီးအရှေ့အတောင်  
တွင်ကန့်လန့်ဖြတ်အတွင်းနှင့်အပြင်အညိုနှင့်လိမ္မော်ရင့် ရောင်အစင်းများပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



စပါးပင်များကွက်၍ဖြူနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ပြန်ပုံရှိစပါးရွက်လိပ်များအတွင်းတွင်  
လောက် ကောင်ငယ်များအား တွေ့ရသည်။

**ဘဝစက်ဝန်း**

- ဥ အဆင့် - (၆-၈) ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၂၅-၃၀) ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၁၀-၁၈၀) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၂-၅) ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

- (၁) ကန်သင်းပတ်လည်ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။
- (၂) မြေလှုပ်ပါ။
- (၃) လမိုင်းထားခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
- (၄) အပင်စိပ်စိပ်စိုက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
- (၅) ဓါတ်မြေသြဇာသင့်တင့်သောနှုန်းထားထည့်ပေးပါ။
- (၆) ဖျက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- (၇) ရွက်ခေါက်ပိုးအားတွေ့ရှိ၍ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းသည်ဖြုတ်ပိုးကျရောက်မှုနှင့်ပေါက်ပွားမှုများ နိုင်သည့်အတွက်ပိုးသတ်ဆေးကိုသတိပြုဆင်ခြင်သုံးစွဲပါ။
- (၈) ကျရောက်မှုများ၍လိုအပ်မှထိသေ၊စားသေ အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ရိတ်သိမ်းပါ။

- ဖလူဗန်ဒိုင်ယာမိုက်(Flubendiamide)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော(Chlorantraniliprole)

- အင်ဒိုဇာကပ်(Indoxacarb)
- ကာဘာရိုင်း(Carbaryl)