

## ၁၁။ ဂျပိုးနက်

Rice Black bug : *Scotinophara coarctata* (Fabricius, 1798)

Hemiptera: Pentatomidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပိုးမမည်များမှာ အညိုရောင်နှင့်အဝါရောင်ရှိပြီး အမဲရောင်အမှတ်များပါရှိပါသည်။ အကောင်ကြီးမှာအညိုရောင်နှင့်အဝါရောင်ရှိပြီးဦးခေါင်းမှာအမဲရောင်ရှိသည်။အရှေ့အတောင်များမှာထောင့်မှန်စတုဂံပုံရှိပြီး အလျားလိုက်အကြော(၆)ခုရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အပင်အတွင်းရှိပင်ရည်များကို စုပ်စားဖျက်ဆီးပါသည်။ဂျပိုးများသည် အရွက်ကြောများ၊ ပန်းခိုင်များနှင့် ပင်ပွားထွက်သည့် အပင်ခြေများတွင်ညပိုင်းအချိန်၌ အများဆုံးဖျက်ဆီးသည်။ အပင်ရည်ကိုစုပ်ယူဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်အပင်များခြောက်သွေ့လာခြင်း၊ အရွက်များအရောင်

ပြောင်းသွားခြင်းနှင့်အပင်ကြီးထွားမှုရပ်သွားပြီး ပင်ပွားထွက်မှုများကို လျော့ကျစေပါသည်။ အပင်ကြီးထွားချိန်တွင် ဖျက်ဆီးခံရပါက အပင်၏အညွန့်လောင်းမှာအဝါရောင်အဖြစ် ပြောင်းသွား ပြီးဆစ်ပိုးလက္ခဏာဖြစ်သည့် အူပုတ်ခြင်း၊(Deadheart) ဆင်တူသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ဂျပိုးကြောင့်ဖြစ်သောကျရောက်သည့် အပင်ကိုနှုတ်ယူကြည့်ပါက အခြေမှ ကျွတ်ထွက်လာခြင်းမရှိပါ။အနံ့ထွက်ချိန်များတွင်လည်းအနံ့ဖြူခြင်း(Whiteheads)လက္ခဏာကို တွေ့ရသည်။ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါက ဖြုတ်လောင်ထားသကဲ့သို့ တစ်ကွင်းလုံးဝါနေသည့် ဂျပိုးလောင်လက္ခဏာ (Bugburn) ကိုတွေ့ရသည်။

**ဘဝစက်ဝန်း**

- ဥ အဆင့် - (၄-၇) ရက်
- အကောင်ငယ်အဆင့် - (၂၆-၃၄) ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၄-၇)ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

- (၁)စိုက်ခင်းအတွင်းထယ်ထိုးပြီးပါက ပေါင်းမြက်များရှင်းလင်းပါ။
- (၂)ဂျပိုးကောင်များ၏ ဘဝစက်ဝန်းကို ပြတ်တောက်စေရန် ရင့်မှည့်ချိန် တူညီသည့် စပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးပါ။
- (၃)အမကောင်များသည်ဥများကို အပင်အောက်ခြေရေနှင့်နီးသည့် နေရာ(သို့)အရွက်၏အောက်တွင်ဥသောကြောင့် ရေအနက် (၈-၁၀) စင်တီမီတာခန့်အား (၁-၂)ရက်ခန့် သွင်းထားခြင်းအားဖြင့် ဥပေါက်နှုံးကိုဟန့် တားခြင်းဖြင့် အကောင်ပေါက်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပါ။
- (၅)ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါက အကောင်ကြီးများကိုအပေါ်သို့တက်လာစေ ရန်ရေသွင်းပါ။
- (၆)အလင်းရောင်ထောင်ချောက်ထွန်း၍အကောင်ကြီးများဖမ်းယူပါ။
- (၇)စိုက်ခင်းအတွင်း ကျန်ရှိသောအကောင်များ ထပ်မံ ကျရောက်မှုမှကာကွယ် နိုင်ရန်ရိတ်သိမ်းပြီးပါက ထယ်နက်နက် ထွန်ပါ။

(၈)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း အကောင်ရှိ သည့် အပင်အောက်ခြေရောက်အောင် ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မရှူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ရိတ်သိမ်းပါ။

- ဒိုင်ယာဇီနွန် (Diazinon)
- အဆီတာမီပရစ်(Acetamiprid)
- ဒိုင်မီသိုအိတ်(Dimethoate)