

၄။ ငမြောင်တောင်

Armyworm: *Spodoptera mauritia* (Boisduval, 1833)

Lepidoptera : Noctuidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်အငယ်သည်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အညိုရောင်သို့ပြောင်းသွား ပြီး ဦးခေါင်းပိုင်းမှာအမဲရောင်ရှိသည်။ခန္ဓာကိုယ်ဘေးဘက်တွင်အစင်းတန်း(၃)ခုပါပြီးအပေါ်တွင်အနက် စက် များတွေ့ရသည်။အကောင်ကြီးသည်မီးခိုးညိုရောင်ဖြစ်ပြီးရှေ့အတောင်တွင်အနက်စင်း များ ပါရှိပြီးထင်ရှားသောအနက်စက်ပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလွှာများ



လောက်ကောင်ပေါက်ကာစတွင် အစိမ်းရောင်အသားကို ခြစ်စားသဖြင့် အစိမ်းရောင်ပျောက်နေသောအရွက်များကို တွေ့နိုင်သည်။လောက်ကောင်ကြီးများသည် အရွက်များ၊အပင်၏အစိတ် အပိုင်း များကို ကိုက်ခြစ်စားသောက်ခြင်းကြောင့် အရွက်များပြတ်ခြင်း၊ပဲ့ခြင်း၊ပေါက်ခြင်းအပင်ငုတ်တို့ဖြစ်နေခြင်းများ ကိုတွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	- (၇) ရက်
လောက်ကောင် အဆင့်	- (၃၀) ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	- (၈-၁၀) ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	- (၂-၄) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

- (၁)ပေါင်းမြက်၊ရိုးပြတ်များအားဆွေးမြေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ကန်သင်းပါးရှပ်ပါ။
 - (၂)မြေပြင်ချိန်တွင်ခိုအောင်းနေသော၊ရုပ်ဖုံးများ၊လောက်ကောင်များအားနှိမ်နင်းရန်ထယ်ထိုးထွန်မွေပါ။
 - (၃)ဘဲများအားစေလွှတ်၍စားသောက်စေခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
 - (၄)အပင်များကိုစောလျင်စွာစိုက်ပျိုးပါ။
 - (၅)ထိသေ၊စားသေအာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုဆေးအညွှန်းစာအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။
- ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်း တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ၍ခူးဆွတ်ပါ။
- ဖလူဗန်ဒိုင်ယာမိုက်(Flubendiamide)
 - ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော(Chlorantraniliprole)
 - ဒိုင်ယာဇီနွန်(Diazinon)
 - လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)