

၇။ ရွှေ့ပြောင်းနံ့ကောင်

Migratory locust : *Locusta migratoria* (Linnaeus, 1758)

Orthoptera : Acrididae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့်အကောင်ငယ်များသည် အနက်ရောင်ရှိ၍ တတိယအဆင့် ရောက်မှ သာ ခန္ဓာကိုယ်ဘေးယက်တွင် အဝါနှင့် လိမ္မော်ရောင် အမှတ်အသား မြင်ရလေ့ရှိ ပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားမှာ အဆင့်အလိုက်(၁၀-၅၅)မီလီမီတာခန့် ရှိသည်။ အကောင်ကြီး သည်လိင်စုံမျိုးပွားနိုင်ပြီး ကြီးမားသော အုပ်စုဖွဲ့နေလေ့ရှိသည်။ အမသည် (၅၀-၇၅)မီလီမီတာနှင့် အထီးမှာ (၄၀ - ၅၅) မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ အေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရောင်မှောင်ပြီး ပူသောရာသီတွင် ဖျော့တော့ သော အရောင်ရှိကာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကောက်ရိုးရောင်တွေ့ရသည်။ လောဘတကြီး စားသောက် တတ် သော သီးသန့်နေထိုင်သော အလေ့ရှိ သည့် အကောင်များတွင် အမဲရောင်အမှတ်ပါ သောအညိုဖျော့ ရောင် တွေ့ရ လေ့ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



shutterstock.com · 2026375217

ထင်ရှားသောဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာအားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။အရွက်များအား စတင် ဖျက်ဆီးတတ်ပါသည်။ အရွက်ကြောများ(အထူးသဖြင့်) ရွက်လယ်ကြောအား ကိုက်ဖြတ် စား သောက်တတ်ပါသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၁၀-၆၅) ရက်
- ပိုးမမည် အဆင့် - (၃၀-၄၀) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၉၀-၁၅၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

စိုက်နည်းစံနစ်များဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- (၁)စိုက်ချိန်စောစိုက်ပါ။
- (၂)သီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။
- (၃)ထယ်/ထွန်နက်နက်မွေပါ။
- (၄)ထောင်ချောက်များဖြင့်ဖမ်းယူပါ။

လူအင်အားဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- (၁)လက်ဖြင့်ကောက်ယူဖျက်ဆီးပါ။
- (၂)မီးရှို့သတ်ပါ။

(၃) ထွန်ခြစ်များဖြင့်မြေကြီးအတွင်းရှိဥများအားဖျက်ဆီးပါ။ (ဥမြုံများအားမြေကြီးအတွင်းမှ ဖော်၍နေပူစေခြင်းဖြင့်ခြောက်ပြီးသေစေရန်)

သဘာဝ(သို့)ခါတုဆေးများဖြင့်နှိမ်နင်းခြင်း

(၁) တမာပိုးသတ်ဆေးအားဆပ်ပြာဖျော်ရည်ဖြင့်ရောစပ်ပက်ဖျန်းပါ။

(၂) အဆိပ်အာနိသင်မပြင်းထန်သောခါတုပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုပါ။

အကောင်အရေအတွက် နည်းချိန်နှင့် အကောင်ငယ် ဘဝတွင် လိုအပ်ပါကထိသော စားသေ အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကိုဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မနူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒယ်လ်တာမီသရင် (Deltamethrin)
- ဆိုက်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
- လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda -cyhalothrin)