

၄။ သကြားမုန်လာငမြောင်တောင်

Beet Armyworm : *Spodoptera Exigua* (Hübner, 1808)

Lepidoptera: Noctuidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်



လောက်ကောင်သည် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ကျယ်ပြန့်သော အဝါရောင် အစင်းများနှင့် အတူ မှိန်ပြပြအစိမ်းရောင်ရှိပြီး အောက်ဖက်တွင်သိသာစွာ အရောင် မှိန်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အသီး၏အပြင်ပိုင်းကိုစားသောက်ကြပြီး တိမ်သောအချိုင့်ဒါဏ်ရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပေါက်များသည် အသီးအတွင်းသို့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းနိုင်သည်။ ဖျက်ပိုးများစွာကို တွေ့ရှိမှသာ ပျက်ဆီးမှုဆိုးဝါးတတ်ပါသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥအဆင့် - (၅-၇) ရက်
- လောက်ကောင်အဆင့် - (၉-၁၀) ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၆-၇) ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၄-၁၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ပင်စိမ်းပင်များအား စိုက်ခင်းပတ်လည်တွင်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂)လောက်ကောင်များအား လက်ဖြင့်ကောက်ယူဖျက်ဆီးပါ။

(၃)ဘဲလွတ်ကျောင်းပါ။

(၄)အလင်းရောင်ထောင်ချောက်တပ်ဆင်၍အကောင်ကြီးများအားဖမ်းယူပါ။

(၅)ညနေစောင်းတွင်ထိသေ၊စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အ တိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
- အဆီဖိတ်(Acephate)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော(Chlorantraniliprole)