

၁၅။ လှေးကျိုင်း

Striped bean flea beetle: *Medythia suturalis* (Motschulsky, 1858)

Coleoptera: Chrysomelidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ကြီးမှာအနက်ရောင်ကျောချပ်ရှိပြီး(၂.၈)မီလီမီတာ ခန့်ရှည်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ပိုးလောက်ကောင်နှင့် အကောင်ကြီးများသည် နံနက်စောစောနှင့် ညနေအေးချိန်တွင် ပဲရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်စားသောက်သည်။ ဖျက်ဆီးခံရသောပဲရွက်များတွင် ညီညာဝိုင်းစက် သော စက်ဝိုင်းပုံအပေါက်များ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ မှ အကောင်ကြီး - (၃-၄)ပတ်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ရုပ်ဖုံးများသေစေရန်ထယ်ထိုး၊ ထွန်မွှေခြင်းပြုလုပ်ပါ။

(၂) ပေါင်းမြက်များရှင်းလင်းပါ။

(၃) မုံလာဥပင်အားထောင်ချောက်သီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၄) ကျရောက်မှုများပါကထိသေ၊ စားသေပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးအားဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
- ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
- ဒယ်လ်တာမီသရင် (Deltamethrin)
- ဒိုင်ယာသိုမေးရှပ်အက်သ် (Diatomaceous earth (DE))