

၂၅။ အစိမ်းရောင်အကြေးပိုး

Soft green scale: *Coccus viridis* (Green,1889)

Hemiptera: Coccidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပိုးမမည်များသည်အဝါဖျော့ရောင်ရှိသည်။ အကောင်ကြီးမှာပြာ၍ အစိမ်းဖျော့ရောင်နှင့် ကျောဘက်တွင် အနက်ရောင်အစက် ပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အပင်၏နူးညံ့သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ရွက်လည်ကြော၊အညွန့်ဖျားနှင့်အသီးများတွင် ကျရောက် လေ့ရှိသည်။ အပင်၏အရည်ကိုစုပ် ယူ စား၍ဖျက်ဆီးသည့်အတွက်အရွက်များကြွေကျ ပြီးအပင်ကြီးထွားနှံ့နှင့် အထွက်နှံ့ကို ထိခိုက်သည်။ အချို့ရည်ထုတ်သောကြောင့် ပုရွက်ဆိတ် များနှင့်အတူတွေ့ရသည်။ အချို့ရည်များကြောင့် မှိုများပေါက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	- နာရီအနည်းငယ်
ပိုးမမည် အဆင့်	- (၄-၆) ပတ်
အကောင်ကြီးအဆင့်	- (၁၀-၅၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများဖြစ်သောဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဆပ်ပြာဖျော်ရည်နှင့် ရော၍ပက်ဖျန်းပါ။

(၂) ပေါင်းမြက် များနှင့်ဖျက်ပိုးကျရောက်ထားသောကိုင်များအားရှင်းလင်း မီးရှို့ပါ။

(၃) ထိသေစားသေ(သို့)ပင်လုံးပြန် အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်း ရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ကာဘာရိုင်း(Carbaryl)
- ဘိုင်ဖန်သရင် (Bifenthrin)
- ဒယ်လ်တာမီသရင်(Deltamethrin)
- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)

