

၁၁။ နှမ်းရွက်လိပ်ပိုး

Sesame Leaf roller : *Antigastra catlaunalis* (Duponchel, 1833)

Lepidoptera: Crambidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်သည် ဦးခေါင်းပိုင်းမှာညို၍ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အစိမ်း ရောင်ရှိပြီး ရှည်သည်။ အကောင်ကြီးသည် လိမ္မော်ညိုရောင်ရှိပြီး အရှေ့အတောင်သည် တြိဂံပုံ သဏ္ဍာန် အဖျားတွင် ချွန်သွားသည်။ အတောင်အစင်းများအား အရှေ့တောင်တွင် ပိုမို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



နှမ်းသီးတောင့်မပေါ်မီ ဥမှပေါက်သော လောက်ကောင်သည် အပင်ထိပ်ရှိ အရွက်နု များအား စားသောက်ဖျက်ဆီးသည်။ ရံဖန်ရံခါ ပင်စည်နှင့် အသီးထဲသို့ ထိုးဖောက် စားသောက်သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အသီးအပွင့်များအား ဖျက်ဆီး ကြသည်။ ပြင်းထန်စွာ ကျရောက်ပါက အပင်ထိပ်ရှိ အရွက်များ လောင်ကျွမ်းသွားသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	- (၂-၄) ရက်
လောက်ကောင်အဆင့်	- (၁၀-၁၂) ရက်
ရုပ်ဖုံးအဆင့်	- (၆-၈) ရက်
အကောင်ကြီးအဆင့်	- (၅-၁၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)ပိုးကျနေသော အရွက်များအားဖယ်ရှားမီးရှို့ပါ။

(၂)ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-Cyhalothrin)
- ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide)