

၄။ သံပုရာ၊ ရှောက်၊ လိမ္မော် ယင်မဲ

Citrus blackfly : *Aleurocanthus woglumi* (Ashby, 1915)

Hemiptera: Aleyrodidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပိုးမမည် နှင့် ရုပ်ဖုံးအဆင့်များသည် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် အနက်ရောင် ရှိကြသည်။ အကောင်ကြီးများတွင် အတောင်များပါရှိပြီး ခဲရင့်ရောင်၊ ခဲပြာရောင် ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ရှိကာ ယင်ဖြူအုပ်စုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ အရောင်အရ ယင်မဲဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်အောက်မျက်နှာပြင်အပေါ်တွင်သေး၍အမဲရောင်ဖျက်ပိုးလေးများအားအုပ်စုလိုက်တွေ့ရသည်။ အရွက်ပင်စည်များအပေါ်တွင်ပျားရည်များစွန့်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ကျပ်ခိုးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖျက်ဆီးခံရသောအရွက်များတွင်လိန်ရှုံ့တွပုံပျက်သွားခြင်းတို့တွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	- (၁၁ - ၃၀) ရက်
ပိုးမမည် အဆင့်	- (၁၈-၆၆) ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	- (၁၆ -၈၀) ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	- (၆ - ၁၂) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ကိုင်းကျပ်၊ ကိုင်းညှပ်များအား ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းပါ။

(၂) စိုက်ခင်းတွင် ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုကို အမြဲကင်းထောက်ပါ။

(၃) ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုအနည်းငယ်တွေ့ရှိပါက ခူးယူဖျက်ဆီးပါ။

(၄) ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ပါကပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Preharvest Interval (PHI) ကို စနစ်တကျလိုက်နာ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan)