

၇။ သီးလုံးထိုးပိုး

Castor capsule borer: *Conogethes punctiferalis* (Guenee, 1854)

Lepidoptera: Crambidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်ရောက်အကောင်ကြီး၏အတောင်ပံသည် အဝါရောင်ရှိပြီး ရင်အုပ်ပိုင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပံများပေါ်တွင် အနက်ရောင်အစက်များပါရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ကျရောက်ဖျက်ဆီးခံရပါက ခေါင်ညွန့်သေခြင်းများတွေ့ရသည်။ အသီးများတွင် အရောင် ပျက်ခြင်း၊ သီးကင်းများကြွေကျခြင်း စသည့်လက္ခဏာများတွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၃-၄) ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၁၇)ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၁၁) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၈-၉)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို ရှင်းလင်းပါ။

(၂) အလင်းရောင်ထောင်ချောက်များတပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။

(၃) အဖိုဆွဲဆောင်ထောင်ချောက်များအသုံးပြုဖမ်းယူပါ။

(၄)ထိသေ၊စားသေ အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတမျိုးမျိုးကိုဆေးအညွှန်း အတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။

- ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-Cyhalothrin)
- ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော(Chlorantraniliprole)