

၉။ အနက်ရောင်လက်ဖက်လှေးပိုး

Black Tea Thrips: *Heliothrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833)

Thysanoptera : Thripidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပိုးမမည်များသည်အနီရောင်မျက်လုံးများရှိပြီးအဝါရောင်ရှိသည်။အရွယ်ရောက်ပိုးမမည်မှာ တာရှည်သည်။ရုပ်ဖုံးသည်ပိုးမမည်ထက်ကြီးပြီးအတောင်ပံရှည်ကာ မီလီမီ(၁) မျက်လုံးကြီး သည်။အကောင်ကြီး၏ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းပိုင်းသည်အနက်ရောင်ရှိပြီးဝမ်းဗိုက်ပိုင်းမှာအညိုနက် ခောင်ဖြစ်သည်။ခြေထောက်မှာအဝါဖျော့ရောင်ရှိပြီးဦးမှင်မှာအဆစ်ဆစ်ရှိသည်။(၈)

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်များ၊ အပွင့်များနှင့် ပင်စည်များတွင် အပေါက်ဖောက်ပြီး သစ်ရည်ကို စုပ်စားသ ဖြင့် အသီးများပေါ်တွင် အစက်အပြောက်များဖြစ်ခြင်း၊ အသီးလှိုင်းခြင်း၊ အသီးခွံအက်ကွဲ၍ မလှမပ ဖြစ်ခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် အသီးပုပ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥအဆင့်	-(၁၄-၁၅)ရက်
ပိုးမမည် အဆင့်	- (၁၀-၁၆) ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	- (၄-၆) ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	- (၃၅) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ဖျက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကို အသုံးပြုပါ။

(၂) ပျိုးပင်ငယ်များပေါ်မှ ရေဖျန်းပါ။

(၃) အပြာရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်များအသုံးပြု၍ ဖမ်းယူပါ။

(၄) စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လိပ်ခုံးကျိုင်းကဲ့သို့သော သဘာဝမိတ်ဆွေပိုးများကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းပါ။

(၅) ထိသေစားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုဆေးအညွှန်းအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
- စပီရိုတတ်ထရာမက် (Spirotetramat)
- ကလိုဖန်နာပြာ (Chlorfenapyr)