

၁၀။ ဖြုတ်စိမ်းပိုး

Indian Cotton Jassid : *Amrasca biguttula biguttula* (Ishida, 1912)

Hemiptera: Cicadellidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ငယ်များ သည် အလင်းရောင်ဖောက်မတတ်ဖြစ်ကာ စိမ်းနုရောင်သန်းပြီး ကန့်လန့်ဖြတ် ရွှေ့လျားသည်။ အရွယ်ရောက်ကောင်များ မှာစိမ်းဝါရောင်သန်းပြီးသပ်ပုံစံရှိကာ ထိပ်တွင် အနက်စက်တစ်စုံပါရှိပြီး ရှေ့တောင်ပံတစ်ခုစီပေါ်တွင် အနက်စက်တစ်စက်ပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွယ်ရောက်ကောင်နှင့်အကောင်ငယ်များသည် အပင်၏သစ်ရည်ကို စုပ်ယူကြသည်။ ဖျက်ဆီးခံရသော အရွက်များတွင် ဝါနုရောင်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ပါက အရွက်များသည် အတွင်းဖက်သို့ကွေးသွားကြပြီး ခွက်ပုံဖြစ်သွားပါသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	- (၆-၇) ရက်
ပိုးမမည် အဆင့်	-(၅-၁၆)ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	-(၁၅-၁၉)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)မစိုက်မီမျိုးစေ့အား အင်မီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid 600 FS/Imdacloprid 70SS) ဆေးများဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂) ပေါင်းပင်များအားရှင်းလင်းပါ။

(၃)အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်တပ်ဆင်၍အကောင်ကြီးများအားဖမ်းယူပါ။

(၄)မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပါ။

(၅) ထိသေ၊စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန် အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတမျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ဘူပရိုဖီဇင် (Buprofezin)

