

၂။ ဝိုးစေးနဲ့

Citrus Mealybug: *Planococcus citri* (Risso, 1813)

Hemiptera: Pseudococcidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ဥများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်အုသည်။ အကောင်ငယ်များတွင် အဖြူရောင်ဖယောင်းလွှာပါပြီး အမျှင်များပါရှိကာ ပယင်းရောင်ရှိသည်။ အကောင်ကြီး၏အထီးတွင် တောင်ပံ ပါရှိပြီး နှာတံရှည်ကာ ပါးစပ်အစိတ်အပိုင်းများမပါရှိပေ။ အမသည် တောင်ပံမဲ့ကာ ကိုယ်ခန္ဓာပြားချပ်ပြီး တိုကာ အနားသားတစ်လျှောက် ဖယောင်းမျှင်များပါရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အကောင်ငယ်ရော အကောင်ကြီးပါ နူးညံ့သောအကိုင်းများနှင့် အသီးများ၏ ဆဲလ်များကို စုပ်ယူသည်။ အရောင်ဖျော့သွားသည်။ ဖျက်ဆီးခံရသော အပင်အစိတ် အပိုင်းများ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားသည်။ ပျားရည်ချိုအမြောက်အများ ထုတ်လုပ်မှု ကြောင့် ကြပ်ခိုးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ မှိုသည်အရွက်များနှင့်အသီးများကိုဖုံးလွှမ်းသွားသည်။ ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါကပန်း ပွင့်များ သည် အသီးဖြစ်လာကြပါ။

