

၁၅။ အဖြူရောင်ဖြုတ်ပိုး

White Leafhopper : *Cofana spectra* (Distant, 1908)

Hemiptera : Cicadellidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်များအပေါ်တွင်စုပ်စားထားသောအစက်အပြောက်များတွေ့ရသည်။အရွက်နှင့်အညွန့်ထိပ်ပိုင်းများတွင်ဖြုတ်အများအပြားတွေ့ရပြီးဝါလာကာညိုခြောက်သွား၍အပင်သေဆုံးသည်။ အဖြူရောင်ဖြုတ်ပိုး မှပျားရည်ချိုထုတ်ပေးခြင်းကြောင့်အမဲရောင် ကြပ်ခိုးမှိုကို ဖြစ်စေသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၁၁) ရက်
- ပိုးမမည်အဆင့် - (၂၁-၂၄) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၂၃-၂၉) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

(၁)မစိုက်မီ ကြံဆစ်ပိုင်းများအားအီမီဒါကလိုပရစ်(Imidacloprid 600 FS/ Imidacloprid 70 SS) ဆေးများဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂) ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။

(၃)ထိသေ၊စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတမျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မရူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)