

၁၇။ ကြံဖြုတ်ပိုး

Sugarcane Planthopper : *Pyrilla perpusilla* (Wilker, 1851)

Hemiptera: Lophopidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝါဖျော့ရောင်ရှိပြီးအထီးအတောင်ပံအကျယ်မှာ(၁၆-၁၈)မီလီ မီတာရှိ၍ အမအတောင်ပံအကျယ်မှာ(၁၉-၂၁)မီလီမီတာရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ပင်ရည်အားစုပ်ယူသောကြောင့်အရွက်များအားနည်းလာပြီးအချို့ဓါတ်(၅၀)% ကျဆင်းကာ အထွက် နှုန်းကျစေသည်။ပျားရည်ချိုများစွန်ထုတ်မှုကြောင့်မိုရောဂါ (*Capnodium* sp.) ဖြစ်စေသည်။ကြပ်ခိုးမှုများကြောင့်အစာချက်လုပ်ခြင်းအားထိခိုက်စေသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၆-၃၀)ရက်
- ပိုးမမည် အဆင့် - (၄၀-၆၀) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၁၄-၂၀၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

- (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းပါ။
- (၂) ဖျက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများအားရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- (၃) နံနက်စောစော စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင် လေတင်ဘက်မှ မီးခိုးမိုင်း တိုက်ပါ။
- (၄) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်တပ်ဆင်၍အကောင်ကြီးများအားဖမ်းယူပါ။
- (၅) မစိုက်မီ ကြံဆစ်ပိုင်းများအားအီမီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid 600 FS/ Imidacloprid 70 SS) ဆေးများဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- (၆) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မရူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျဆေးဆွတ်ပါ။
 - ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
 - ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
 - ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan)
 - အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)