

၁။ ဂုန်လျှော်ပင်စည်ထိုးကျိုင်း

Jute stem weevil : *Apion corchori* (Marshall, 1972)

Coleoptera: Apionidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်ရောက်အကောင်(အထီး)သည်အနက်ရောင်(သို့)အညိုရင့်ရောင်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အမ၏ဥအုရာတွင်ထိုးထောက်သောအပေါက်များနှင့်ပင်စည်အားထိုးဖောက်မှုများကြောင့်ဂုန်လျှော်အရည်အသွေးအားကျဆင်းစေသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၃-၅) ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၈ - ၁၈ ) ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၄) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် -(၂-၅)လ

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

(၁) ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ဖျက်ပိုးကျရောက်ထားသောရိုးပြတ်များအားဖယ်ရှားပါ။

(၂) အပင် ဦးရေလျော့ချချိန်တွင် ဖျက်ပိုးကျရောက်ထားသောအပင်များအားဖယ်ရှားပါ။

(၃) နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာပုံမှန်ထည့်ပေးပါ။

(၄) စိုက်ချိန်စောစောစိုက်သောအပင်များတွင်ပိုမိုကျရောက်တတ်သဖြင့်နောက်ကျစိုက်ပျိုးပါ။

(၅) ထိသေစားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေး အညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။

- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
- ကာဘာရိုင်း (Carbaryl)
- အဆီဖိတ် (Acephate)