

**၂။ ဂုန်လျှော်ထွာကောင်စိမ်း**

**Jute semi-looper : *Anomis sabulifera* (Guenée, 1852)**

**Lepidoptera: Noctuidae**

**ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ**



ဖလံကောင်ကြီးသည် မြေကြီးညိုရောင်ရှိပြီး အရှေ့တောင်ပေါ်တွင် အရောင်ရင့် အစက် အပြောက် နှင့် အစင်းကြောင်းများ ပါရှိသည်။

**ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ**



ထိပ်ဖူးအရွက်များတွင် အပေါက်များ တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါက အရွက်များ မရှိသော ကိုင်းများကိုသာ တွေ့နိုင်သည်။ ဂုန်လျှော်အသီးတောင့်များပေါ်တွင် အပေါက်များ တွေ့နိုင်သည်။

**ဘဝစက်ဝန်း**

ဥ အဆင့်

- (၂-၃ ) ရက်

လောက်ကောင် အဆင့် - (၉ - ၁၆ ) ရက်  
ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၄-၈) ရက်  
အကောင်ကြီး အဆင့် - (၄ - ၇ )ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

- (၁)ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ထယ်ရေးနက်နက်ထိုး၍ မြေထဲရှိ ရုပ်ဖုံးများကို ဖျက်ဆီးပါ။
- (၂) စိုက်ချိန် စောစောစိုက်ပါ။
- (၃)သီးလှည့်စိုက်ပါ။
- (၄)ဓာတ်မြေဩဇာကို အချိန်ကိုက် နှုန်းထားမှန်စွာ အသုံးပြုပါ။
- (၅)ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုကို ပုံမှန် ကင်းထောက်ပါ။
- (၆) အပင်ထိပ်များအားဖြတ်ပေးပါ။
- (၇) ထိသေ၊စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။

- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda-cyhalothrin)
- အဆီဖိတ် (Acephate)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော (Chlorantraniliprole)