၃။ ဝါရွက်လိပ်ပိုး

Cotton leaf roller: *Haritalodes derogata* (Fabricius, 1775)

(Lepidoptera: Crambidae)

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဌာန်များ

ဖလံအကောင်ကြီး၏အတောင်သည် နို့နှစ်ရောင်အောက်ခံပေါ်တွင် အညိုရင့်ရောင်အစင်းများ နှင့် ရှုပ်ထွေးနေသော ပုံသဏ္ဍာန်များရှိပြီး အဖျားပိုင်းတွင် ပါလွှာသော အညိုရောင်အစင်း ပါရှိ သည်။ အတောင်၏အကျယ်မှာ (၃၀-၄၀) မီလီမီတာခန့်ရှိပြီး ဦးခေါင်း နှင့် ရင်အုပ်ပေါ်တွင် အမဲရောင်အစက်များ ပါရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ

ပိုးလောက်ကောင်များသည် အရွက်များအား လိပ်ပြီး အရွက်၏အနားများကို စားသောက်ဖျက်ဆီးသောကြောင့် အရွက်များလိမ်တွန့်ကာ ကြွေကျစေသည်။ အရွက်ကြွေခြင်းကြောင့် ဂုန်လျှော်တောင့်များ အရွယ်မတိုင်မီ ရင့်မှည့်ခြင်းနှင့် အဖူးဖြစ်ပေါ်မှု ပျက်ဆီးစေခြင်းများ ဖြစ်စေသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	**– (၃)** ရက်
လောက်ကောင် အဆင့်	**– (၂၃ – ၇၃)** ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	**– (၈)** ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	**– (၄–၇)** ပတ်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)ဘက်တီးရီးယား *Bacillus thuringiensis* အားလောက်ကောင်ငယ်စဉ်အသုံးပြုပါ။

(၂) ထိသေ၊စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။

- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda–cyhalothrin)
- အဆီဖိတ် (Acephate)
- ဖလူဗန်ဒိုင်ယာမိုက် (Flubendiamide)