

၅။ဝါပိုးနီ

Red cotton stainer: *Dysdercus cingulatus* (Fabricius, 1775)

Hemiptera: Pyrrhocoridae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ငယ်အဆင့် (၅) ဆင့်ရှိပြီး၊ အဆင့်အားလုံးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော အကောင်ကြီးနှင့် ဆင်တူသည်။ ပထမအဆင့်အကောင်ငယ်များသည် မြေကြီးအောက်ထဲတွင် ပထမအရှေ့စလဲသည် အထိနေသည်။ အရွယ်ရောက်ကောင်များသည် အလျားအားဖြင့် (၁၂-၁၈) မီလီမီတာ အထိရှိပြီး (၃.၅ - ၅.၅) မီလီမီတာ အကျယ်ရှိပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ပန်းဖူးနှင့်အတောင့်တွင်းမှ အစေ့ရည်ကို စုပ်ယူစားသောက် ဖျက်ဆီးသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

၉ အဆင့် - (၆-၉) ရက်

ပိုးမမည်အဆင့် - (၃၂ - ၄၁) ရက်
အကောင်ကြီးအဆင့် - (၁၆-၂၁)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခြားဖျက်ပိုးလက်ခံပင်များဖြစ်သော Malvaceous အုပ်စုဝင် (ခေါင်ရမ်းပန်း)အပင်များ အား ဖယ်ရှားပါ။

(၂)ဖျက်ပိုးကျရောက်ထားသောအပင်များအားနှုတ်ယူဖျက်ဆီးပါ။

(၃)ထယ်/ထွန်နက်နက်ထွန်ပါ။

(၄)ရိတ်သိမ်းပြီးမြေလှုပ်ထားပါ။ (မြေကြီးအတွင်းရှိဖျက်ပိုးဥများ နေပူသေစေရန်/သား ရဲ့ ကောင်များစားသောက်နိုင်ရန်)

(၅)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး(Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန်(Carbosufan)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)