

၆။ မွှား

Broad mite: *Polyphagotarsonemus latus* (Banks ,1904)

Acariformes: Tarsonemidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ( အချင်း-၂၀၀ မိုက်ခရုန်မီတာ) ကျောက်ဘက်တွင် အကာအကွယ် အလွှာ မပါဝင်ပါ။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်နုအနားများ လိပ်နေတတ်သည်။ အရွက်များသည် ကျပ်ဆတ်ပြီး သံချေးရောင် ဖြစ်နေ တတ်သည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥအဆင့်

-(၂-၃)ရက်

လောက်ကောင်မှရှုပ်ဖုံးအဆင့် - (၂-၃) ရက်  
အကောင်ကြီးအဆင့် - (၁၁-၁၅ ) ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

(၁) ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုကို ပုံမှန် ကင်းထောက်ပါ။

(၂) တမာပိုးသတ်ဆေး၊ ငရုတ်သီးဖျော်ရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူဖျော်ရည်များအသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။

(၃) ထိသေ၊ စားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan)
- အဘာမတ်တင် (Abamectin)