

၉။ ပျံပိုး

Green Peach Aphid: *Myzus Persicae* (Sulzer, 1776)

Hemiptera: Aphididae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ငယ်သည် အစောပိုင်းတွင်အစိမ်းရောင်ရှိ၍ တဖြည်းဖြည်း အဝါရောင် သန်း လာသည်။ အကောင်ကြီးသည် စိမ်းဝါရောင်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ဖျက်ဆီးခံထားရသော အပင်များတွင် စေးပျစ်ပျစ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူ အရောင်ဖျော့ပြီး အရွက်များတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားသည်။ ပျားရည်ချိုးက စစ်ထုတ်မှုကြောင့် ကြပ်ခိုးမှုများ တိုးပွားလာပြီး အပင်ပုသွားသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥအဆင့် - (၃-၄)ရက်
- ပိုးမမည်အဆင့် - (၅-၆)ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၁၂-၁၃)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

(၁)ခရမ်းချဉ်၊ဆလပ်၊ပြောင်း၊တရုတ်နံနံ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊စမုံစပါးပင်တို့ဖြင့်တွဲဖက်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂)သင့်တော်သောပင်ကြားတန်းကြားအသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။အပင်စိပ်စိပ်မစိုက်ပါနှင့်။

(၃) ရေဂါလံဝက်တွင်ဆပ်ပြာတစ်ဇွန်း၊ဆီတစ်ဇွန်း၊ရောမွှေပက်ဖျန်းပါ။

(၄)အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်တပ်ဆင်၍အကောင်ကြီးများဖမ်းယူပါ။

(၅)ပင်လုံးပြန့်အာနိ သင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန်(Carbosufan)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)