

## ၉။ ဖြုတ်စိမ်းပိုး

Indian Cotton Jassids : *Amrasca biguttula biguttula* (Ishida, 1912)

Hemiptera: Cicadellidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ငယ်များ သည် အလင်းရောင်ဖောက်မတတ်ဖြစ်ကာ စိမ်းနုရောင်သန်းပြီး ကန့်လန့်ဖြတ် ရွှေ့လျားသည်။ အရွယ်ရောက်ကောင်များ မှာ စိမ်းဝါရောင်သန်းပြီးသပ်ပုံစံရှိကာ ထိပ်တွင် အနက်စက်တစ်စုံပါရှိပြီး ရှေ့တောင်ပံတစ်ခုစီပေါ်တွင် အနက် စက်တစ် စက်ပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွယ်ရောက်ကောင်နှင့်အကောင်ငယ်များသည် အပင်၏သစ်ရည်ကို စုပ်ယူကြသည်။ ဖျက်ဆီးခံရသော အရွက်များတွင် ဝါနုရောင်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိုးရွာစွာ ကျရောက်ပါက အရွက်များသည် အတွင်းဖက်သို့ကွေးသွားကြပြီး ခွက်ပုံဖြစ်သွားပါသည်။

**ဘဝစက်ဝန်း**

- ဥ အဆင့် - ( ၆-၇) ရက်
- ပိုးမမည် အဆင့် -(၅-၁၆)ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် -(၁၅-၁၉)ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

(၁) မစိုက်မီ မျိုးစေ့ အားအီမီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid 600 FS /Imidacloprid 70 SS ) ဆေးဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂) ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။

(၃) ထိသေစားသေ(သို့)ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတမျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ဘူပရိုဖီဇင် (Buprofezin)

