

၁၂။ ဖျံပိုး

Green Peach Aphid: *Myzus Persicae* (Sulzer, 1776)

Hemiptera: Aphididae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အကောင်ငယ်သည် အစောပိုင်းတွင်အစိမ်းရောင်ရှိ၍ တဖြည်းဖြည်း အဝါရောင် သန်းလာသည်။ အကောင်ကြီးသည် စိမ်းဝါရောင်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ဖျက်ဆီးခံထားရသော အပင်များတွင် စေးပျစ်ပျစ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူ အရောင်ဖျော့ပြီး အရွက်များတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားသည်။ ပျားရည်ချိုးက စစ်ထုတ်မှုကြောင့် ကြပ်ခိုးမှုများ တိုးပွားလာပြီး အပင်ပုသွားသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥအဆင့် - (၃-၄)ရက်
- ပိုးမမည်အဆင့် - (၅-၆)ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၁၂-၁၃)ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ**

(၁) ခရမ်းချဉ်၊ ဆလပ်၊ ပြောင်း၊ တရုတ်နံနံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ စမုံစပါးပင်တို့ဖြင့် တွဲဖက်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂) သင့်တော်သောပင်ကြားတန်းကြားအသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။ အပင်စိပ်စိပ်မစိုက်ပါနှင့်။

(၃) ရေဂါလံဝက်တွင် ဆပ်ပြာတစ်ဇွန်း၊ ဆီတစ်ဇွန်းရောမွှေပက်ဖျန်းပါ။

(၄) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်တပ်ဆင်၍ အကောင်ကြီးများအားဖမ်းယူပါ။

(၅) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မူးဆွတ်မိစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍ စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan)
- အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)