

၃။ ငှက်ပျောအမြစ်စားကျိုင်း

Banana Weevil/Banana Root Borer: *Cosmopolites sordidus* (Germar, 1824)

Coleoptera: Cuculionidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်မရောက်သေးသည့် လောက်ကောင်သည် နီညိုရင့်ရောင်ဦးခေါင်းရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖြူရောင်ရှိသည်။ ရုပ်ဖုံးမှထွက်ခါစအကောင်ကြီးမှာ တောက်ပပြီး အညိုရင့်ရောင်မှ မီးခိုးနက်ရောင်ထိရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



လောက်ကောင်များသည် အမြစ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကာ စားသောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် အရွက်များ ညှိုးနွမ်းသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမြစ်အတွင်းတွင် လှိုဏ်ခေါင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အပင်ကို သေစေပါသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥအဆင့်	-(၅-၇)ရက်
လောက်ကောင်အဆင့်	-(၇)ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	-(၆-၈)ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	- (၁၅-၂၀) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)အမြစ်စားကျိုင်းကျရောက်ထားသော ငှက်ပျောပင်ခေါင်းအားလုံးမကျန် တူးထုတ်ပြီး ဖျက်ဆီး ပါ။

(၂)ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အပင်ကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၃)စိုက်ခင်းအတွင်း များစွာအဆိပ်သုံး၍ မြေကျင်းထောင်ချောက်တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။

(၄)အပင်ခြေတွင်ဖစ်ပရိုနေး(Fipronil 3GR) ထည့်ပါ။

(၅)ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူး ဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍ စနစ် တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ကာဘာရိုင်း (Carbaryl)
- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-Cyhalothrin)
- ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)