

၄။ ငှက်ပျော့ဘေတောင်ဂျပ်ပိုး

Banana Lacewing Bug: *Stephanitis typica* (Distant, 1903)

Hemiptera: Tingidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်ရောက်ကောင်၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် လွန်းဆံပုံရှိပြီး ဝါညိုရောင်နှင့် အဖြူရောင်ရော ယှက်နေသည့်တောင်ပံပေါ်တွင် အညိုရင့်ရောင်အစက်အပြောက်များပါရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွယ်မရောက်သေးသည့် ပိုးမမည်ကောင်နှင့် အကောင်ကြီးများသည် အရွက် အောက်မျက်နှာ ပြင်နှင့် ရွက်လယ်ကြောတို့တွင် နေထိုင်စားသောက်လေ့ရှိသည်။ စားသောက် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် အရွက်အပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် အဖြူရောင် အစက် ပြောက်ငယ်များဖြစ်ပေါ်ပြီး အောက်မျက်နှာ ပြင် တွင် အမဲရောင် အကွက်များ ကျန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥအဆင့် - (၁၂)ရက်

ပိုးမမည်အဆင့် - (၁၃)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ဖျက်ပိုးကျရောက်ဖျက်ဆီးခံထားရသော အပင်များနှင့် အသီးများကို ဖယ်ရှားဖျက်ဆီးပါ။

(၂) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်ကို တစ်ဧကလျှင် (၅)ခု တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။

(၃) ထိသေစားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မနူး ဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
- စပီရိုတတ်ထရာမက် (Spirotetramat)
- ပိုင်မီထရိုဇင်း(Pymetrozine)