

၁၀။ ငှက်ပျောရွက်လိပ်/ကပ်လိပ်ပြာ

Banana Skipper: *Erionota torus* (Evans, 1941)

Lepidoptera : Hesperiiidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်၏ ဦးခေါင်းသည် အနက်ရောင်ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်သည် အဖြူရောင်ရှိပြီး ဖယောင်းလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ရုပ်ဖုံးကို နေထိုင်စားသောက်သည့် အရွက်လိပ်ထဲတွင်သာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွယ်မရောက်သေးသည့် လောက်ကောင်သည် အရွက်များကိုလိပ်၍ နေထိုင်စားသောက်ဖျက်ဆီးလေ့ရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အရွက်များပုံပျက်၍ ပျက်ဆီးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၅ -၈) ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၃ -၄) ပတ်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၈-၁၂) ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် -(၆-၁၂)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ဥမြုံ့၊ လောက်ကောင်နှင့် ရုပ်ဖုံးများကို လက်ဖြင့်ကောက်ယူဖျက်ဆီးပါ။

(၂) ထိသေ၊စားသေအာနိသင်ရှိသော ပိုးသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်း အတိုင်းသုံးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မရူး ဆွတ်မိစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ၍ စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ကာဘာရိုင်း(Carbaryl)
- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-Cyhalothrin)
- ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
- ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက်ဒ် (Flubendiamide)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော (Chlorantraniliprole)