

၁၀။ သံပုရာ၊ ရှောက်၊ လိမ္မော် ယင်မဲ

Citrus blackfly : *Aleurocanthus woglumi* (Ashby, 1915 )

Hemiptera: Aleyrodidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ပိုးမမည် နှင့် ရုပ်ဖုံးအဆင့်များသည် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် အနက်ရောင် ရှိကြသည်။ အကောင်ကြီးများ တွင် အတောင်များပါရှိပြီး ခဲရင့်ရောင်၊ ခဲပြာရောင် ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် အနီရောင်၊ လိမ္မော် ရောင်ရှိကာ ယင်ဖြူအုပ်စုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ အရောင်အရ ယင်မဲဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်အောက်မျက်နှာပြင်အပေါ်တွင်သေး၍အမဲရောင်ဖျက်ပိုးလေးများအားအုပ်စုလိုက်တွေ့ရ သည်။အရွက်ပင်စည်များအပေါ်တွင်ပျားရည်များစွန့်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ကျပ်ခိုးမှုများဖြစ် ပေါ် စေသည်။ဖျက်ဆီးခံရသောအရွက်များတွင်လိန်ရှုံ့တွပျက်သွားခြင်းတို့တွေ့ရသည်။

**ဘဝစက်ဝန်း**

ဥ အဆင့်	- (၁၁ - ၃၀) ရက်
ပိုးမမည် အဆင့်	- (၁၈-၆၆) ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	- (၁၆ -၈၀) ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	- (၆ - ၁၂) ရက်

**ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

(၁) ကိုင်းကျပ်၊ ကိုင်းညှပ်များအား ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းပါ။

(၂) စိုက်ခင်းတွင် ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုကို အမြဲကင်းထောက်ပါ။

(၃) ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုအနည်းငယ်တွေ့ရှိပါကအရွက်များ ခူးယူဖျက်ဆီးပါ။

(၄) ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ပါကပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မခူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ၍ စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန်(Carbosufan)