

၁၃။ သရက်ခူမွေးရည်

Tea Flush Worm /Mango hairy caterpillar: *Cricula trifenestrata* (Helfer, 1837)

Lepidoptera: Saturniidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ဖလံအကောင်ကြီး၏ ဦးခေါင်း၊ ရင်အုပ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဝါညိုရောင် အမွှေးများနှင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အကောင်ကြီး(အထီး)မှာ အညိုရောင်ရှိပြီး အကောင်ကြီး (အမ)မှာ နီညိုရောင် သန်း သောအရောင်ဖြစ်ပြီး ရှေ့အတောင်ပေါ်တွင် အနက်ရောင် အစင်းလှိုင်းပါရှိသည်။ ကြည်လင် သော အပြောက်(၂-၃) ခုပါရှိပြီး အဆိုပါ အစင်းကြောင်းသည် နောက်အတောင် အဆုံးထိ တွေ့ရသည်။ အရွယ်ရောက် လောက် ကောင်များတွင် ချောကလက်ရောင်/နီဝါရောင်နှင့် ကိုယ်ပေါ်တွင် အဝါရောင် အစက် အပြောက်များကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရသည်။ နီဝါရောင် အမွှေးအမျှင်များစွာပါရှိသော ခူကောင် များဖြစ်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံ လက္ခဏာများ



သရက်တွင် အဓိကကျရောက်သော အရွက်စား ဖျက်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ရွှေ ရောင် နူးညံ့သော ချည်မျှင်များကို ထုတ်သည်။ အပင်၏ အရွက်များကိုသာ စားသောက်ဖျက်ဆီးပြီး ရိုးတံသာကျန်သည် အထိ စားသောက် ဖျက်ဆီး သည်။ သီဟိုလ်နှင့် အခြားသီးနှံများကိုလည်း စားသောက် ဖျက်ဆီးသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥအဆင့် - (၁၅-၂၀)ရက်
- လောက်ကောင်အဆင့် - (၄၀-၅၀)ရက်
- ရုပ်ဖုံးအဆင့် - (၂၅)ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၃-၄)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)အပင်ပေါ်တွင်တွေ့ရသော ဥမြုံများ၊ လောက်ကောင်များ၊ပိုးရုပ်ဖုံးများကိုလက်နှင့် ကောက် ယူ ဖျက်ဆီးပါ။

(၂) အလင်းရောင်ထောင်ချောက်ထွန်းပြီး အကောင်ကြီးများကို ဖမ်းယူဖျက်ဆီးပါ။

(၃)ထိသေ၊စားသေ အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေး အညွှန်းအ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ၍ စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဒယ်လ်တာမီသရင် (Deltamethrin)
- ကာဘာရိုင်း (Carbaryl)
- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda-cyhalothrin)