

၁၄။ သရက် ရွက်ဖြတ်ကျိုင်း

Mango Leaf Cutting Weevil : *Deporaus marginatus* (Pascoe, 1883)

Coleoptera: Curculionidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ဥမှပေါက်စ လောက်ကောင်ငယ်မှာ နို့နှစ်ရောင်၊ နောက်ပိုင်းဆင့်တွင် အဝါရောင် (သို့) အစိမ်းရင့် ရောင်ပြောင်းသွားပြီး (၅) မီလီမီတာခန့်ရှည်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် သေးသွယ် ရှည်လျားကာ အနည်းငယ်ကွေးသောပုံစံရှိသည်။ အကောင်ကြီးမှာ ဘဲဥရှည်ပုံရှိပြီး မီးခိုး ဖျော့ရောင် အမွှေး အမျှင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဦးခေါင်း၊ ရင်အုပ်နှင့် နှာတံအခြေမှာ လိမ္မော်ရောင်ရှိပြီး ရှေ့အတောင်မှာ ဝါညိုရောင်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



သရက်ပင်များတွင် အရွက်များမှာ ကပ်ကြေးဖြင့် ဖြတ်ထားသကဲ့သို့ တိတိရိရိ ပြတ်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ဖြတ်ခံရသည့် အရွက်အပိုင်းများကို မြေပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။ အကောင်ကြီးများစားသောက် ဖျက်ဆီးထားသဖြင့် အရွက်နုများ တွင် အပေါက်များလည်း တွေ့ရသည်။ ကျရောက်မှုများပါက အရွက်များခြောက်သွေ့သွားသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

ဥ အဆင့်	-(၁-၄) ရက်
လောက်ကောင် အဆင့်	-(၇-၁၀)ရက်
ရုပ်ဖုံး အဆင့်	-(၁၀-၁၄)ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့်	-(၄၄-၆၆)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ဥများ၊ အရွက်များ၊ အရွက်လိပ်များကို လက်နှင့်ကောက်ယူဖျက်ဆီးပါ။

(၂) အပင်ခြေ အား မြေဆွဲ ၊ ထွန်ယက်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုးရုပ်ဖုံးများကို နှိမ်နင်းပါ။

(၃) အရွက်ပြတ်များ၊ အကောင်ကြီးများကျရောက်မှု များပါက ထိသေ၊စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေး အညွှန်းအ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda-cyhalothrin)
- ဒိုင်ယာဇီနွန်(Diazinon)
- ဆိုင်ပါမီသရင်(Cypermethrin)