

၁။ ကိုကိုးဖလံ

Cocoa tussock moth: *Orgyia postica* (Walker, 1855)

Lepidoptera: Erebidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်သည်အဝါရောင်ရှိပြီးအညိုရောင်အမွှေးကြဲကြဲဖုံးထားပြီးကျောနှင့်ဘေးဖက်အပိုင်းတွင်အညိုရောင်အစင်းများတွေ့ရသည်။လောက်ကောင်၏ရင်ပိုင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းများတွင်အညိုရောင်အမွှေးများပါရှိသည်။အကောင်ကြီး(အထီး)သည်အညိုရောင်ရှိပြီးဝမ်းဗိုက်တိုသည်။အကောင်ကြီး(အမ)တွင်အတောင်ပံမပါရှိပါ။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်ကြွေခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥအဆင့် - (၅-၆)ရက်
- လောက်ကောင်အဆင့် - (၁၅-၂၆)ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၄-၇)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ပိုးလောက်ကောင်များနှင့် ရုပ်ဖုံးအိမ်များကို စုဆောင်းဖျက်ဆီးပါ။

(၂) ထိသေ၊စားသေ အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
- အင်ဒိုဇာကပ် (Indoxacarb)
- ဖလူဗန်ဒိုင်ယာမိုက် (Flubendiamide)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော (Chlorantraniliprole)