

၆။အာဖရိကန်ခရုကြီး

Giant African Land Snail: *Lissachatina fulica* (Bowdich, 1822)

Stylommatophora : Achatinidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



ခရုခွံပုံစံမှာ ကတော့ပုံစံရှိသည်။ ခရုခွံအရောင်မှာ အညိုဖျော့ရောင်ဖြစ်ပြီး အစာပေါ်မူတည်၍ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အကောင်ငယ် စဉ်တွင် ခရုခွံ အညိုဖျော့ရောင်ပေါ်တွင် အညို ရောင် နှင့် နို့နှစ်ရောင် တစ်လှည့်စီ ရစ်ပတ်လျက်ရှိပြီး အကောင်ကြီး တွင်ရစ်ပတ်ထားသော အရစ် များသည် အပေါ်ပိုင်းတွင်သာ ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ခရုငယ်များသည် အရည်ရွှမ်း သောအရွက်များနှင့် အညွန့်နုလေးများကို စားသောက်ဖျက်ဆီးသည်။ ယင်းခရုဆိုးရွားစွာကျရောက်သည့် စိုက်ခင်းများတွင် ပင်စည်များ ကျိုးကျဖျက်ဆီး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၁၇) ရက်
- တွားသွားကောင် အဆင့် - (၅-၁၅) ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၅-၆) နှစ်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁)ဥမြုံနှင့် ခရုများကို လက်ဖြင့်ကောက်ယူဖျက်ဆီးပါ။

(၂)မျှားစာချပါ။ (သဘောရွက်၊နာနတ်ခွံ၊ဂေါ်ဖိရွက်၊ဖရဲခွံ)

(၃)စားသေအာနိသင်ရှိ ခရုသတ်ဆေး ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်းသုံးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ဤစနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- မက်တယ်လ်ဒီဟိုက် (Metaldehyde)
- နီကလိုဆမိုက် (Niclosamide)
- ကာဘာရီင်း+ မက်တယ်လ်ဒီဟိုက် (Carbaryl+Metaldehyde)

