

၄။ခရမ်းချဉ် ရွက်ထွင်းပိုး

Tomato leafminer: *Phthorimaea absoluta* (Meyrick, 1917)/ *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917)

Lepidoptera :Gelechiidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အရွယ်ရောက်လောက်ကောင်သည်ကျောဘက်ပိုင်းတွင်ဒိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အမှတ်အသားပါရှိပြီး ပန်းရောင်ဖြစ်သည်။အကောင်ကြီးသည်(၁၀)မီလီမီတာရှည်ပြီးမီးခိုးရောင်အကြေးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ထင်ရှားသောလက္ခဏာမှာအကွက်ပုံလိုဏ်ခေါင်းများအားအရွက်များတွင်တွေ့ရသည်။လောက်ကောင်များသည်အရွက်နှင့်ပင်စည်အားပိုမိုနှစ်သက်သော်လည်းအသီးနှင့်အသီးအတွင်းတွင်လည်းတွေ့ရတတ်သည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၅-၇) ရက်
- လောက်ကောင်အဆင့် - (၂၀) ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၉ - ၁၃) ရက်
- အကောင်ကြီးအဆင့် - (၁၈-၂၈)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

- (၁) ထယ်နက်နက်ထိုးပါ။
- (၂) သီးလှည့်စိုက်ပါ။
- (၃) လောက်ကောင်နှင့်ရုပ်ဖုံးများသေစေရန်မြေလှုပ်ပါ။
- (၄) အလင်းရောင်ထောင်ချောက်အသုံးပြု၍ဖလံများအားဖမ်းယူပါ။
- (၅) ဘက်တီးရီးယား (*Bacillus thuringiensis*) နှင့် မှို (*Beauveria bassiana*) အသုံးပြုနှိမ်နင်းပါ။
- (၆) ထိရိုမုန်းထောင်ချောက်များအသုံးပြု၍ဖလံထီးများအားဖမ်းယူပါ။
- (၇) ထိသေ၊ စားသေ(သို့)ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုပါက အညွှန်း တွင် ဖော်ပြထားသည့် မူးဆွတ်မိစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဆိုင်ရိုမက်ဇင်း)Cyromazine)
- လူဖီညူရုန်(Lufenuron)
- ကလိုဖန်နာပြာ (chlorfenapyr)
- စပီနီဆက်(Spinisad)
- မီသိုဆိုင်ဖီနိုဆိုက် (Methoxyfenozide)

- လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda-cyhalothrin)